

## 矮仙丹



- 1.茜草科常綠灌木原產中國。
- 2.每年開花三次，又名三段木。仙丹花、三段木均為日名，本草綱目稱買子木或賣子木。
- 3.日照充足的環境下，盛開的花朵像繡球，所以又名紅繡球。
- 4.聚繖花序 - 花軸頂端生一花，下端兩側分枝頂各長一花。



## 黃金榕



- 1.桑科榕屬，常綠灌木或喬木。
- 2.葉子互生，倒卵形，葉面平滑，摘下流有白乳狀液汁，白乳汁具有毒性。
- 3.葉子為綠色，新葉黃金色，為隱花果。
- 4.可修剪成各種樹形，這棵即修剪成鳥形，適合園藝栽培。





## 大葉欖仁 ↓

- 1.別名：枇杷樹、雨傘樹、古巴梯斯樹。  
俗名：枇杷樹、雨傘樹、龜仔樹、楠仁樹、環保樹。
- 2.花：花期 3-6 月，白色穗狀花序，缺乏花瓣，頂端是雄花，下方是雌花及兩性花。
- 3.果實：7-9 月，廣橢圓形核果，外形像橄欖，可食的仁，含杏仁味的油，果子含纖維質，可在水上飄浮，內果皮堅硬而質輕可漂浮於海面上，具有海漂植物傳佈的特性。
- 4.欖仁樹的葉子可入藥，用以治療肝疾，需是自然落下，曬乾的葉子才有用！
- 5.莖：樹可高達 20 公尺，根系發達，老樹常發現樹根會形成板根，莖呈水平開展幹直立，樹冠層傘形。



## 小葉欖仁 ↓

- 1.科別：使君子科
- 2.別名：雨傘樹、細葉欖仁、非洲欖仁樹
- 3.冬季葉會枯落，葉掉盡後剩下細密的枝條，到了春天又冒出嫩芽，長滿整株，分外清新優美。
- 4.景觀樹、行道樹，樹材可供建築，果皮含鞣質，可作染料。
- 5.原產熱帶非洲。性喜高溫多濕，排水，日照力求良好。根群生長穩固後非常抗強風吹襲，並耐鹽分，為優良的海岸樹種。枝桠橫生，甚具層次之美感。
- 6.種子外殼堅硬，可隨海浪旅行散播下一代





## 水黃皮 ↓

別名：九重吹、水流豆、臭腥仔

簡介：半落葉性喬木。多分枝。樹冠傘形。因葉似「黃皮」而稱「水黃皮」。耐旱耐風吹，故有「九重吹」之名。豆莢呈木質化具漂浮性，可藉水流傳播，又稱水流豆。樹性強健，耐旱又耐風，常被用來種植為防風樹或行道樹等。種子和根部毒性較強。樹皮灰褐且平滑，有縱紋。

花：總狀花序，腋生，秋天時，開淡紫紅色的小花，花邊開邊落，花冠蝶形。

果實：莢果成熟時深褐色，木質，長橢圓形、刀狀、厚扁平。內有種子一枚。



## 酒瓶椰子 ↓

原產地：模里西斯、馬斯加里尼島

簡介：

- 1.常綠小喬木。酒瓶椰子樹形上細下粗如其名，基部猶如酒瓶般肥大，最大外徑可達 38~60 公分，具褐色環紋相當顯著。
- 2.全株高約 3~5 公尺，葉呈羽狀複葉，全裂，小葉 40~60 對，披針形，葉柄呈紅褐色，堅硬，葉鞘圓桶狀如竹，樹皮緊被樹幹部，葉長 1~1.5 公尺。
- 3.雌雄同株，漿果成熟呈金黃色。酒瓶椰子生性強健，喜高溫多濕，日照需充足，不耐寒。
4. 酒瓶椰子生長緩慢，壽命長達數十年，從種子育苗至開花結果，需時 20 餘年，母株開花至果實成熟需 18 個月。
5. 雌雄同株，肉穗花序。 漿果熟呈金黃色，種子橢圓形，長 1 至 1.5 公分。是頗受喜愛的庭園樹、盆栽樹。





## 華北檉柳 ↓

科別：檉柳科

別名：檉柳、赤檉、素楊、河柳

原產地：中國華北

用途：觀賞，全株及乳汁可藥用

生長特性：陽性植物，生長強健，不擇土壤

形態描述：落葉亞灌木，株高 3-6 公尺，分枝纖弱開張且常下垂；葉小，披針形，漸尖，密生如鱗；花為腋生穗狀花序；蒴果內含多數種子，種子先端有細長毛。一年開花兩次，花期在春末和秋末。栽培以扦插或高壓法繁殖，春、夏兩季為適合；生性強健，栽培的土質不拘，只需日照充足的濕潤地帶，以肥沃而富含有機質的砂質壤土最佳，但排水需良好，即使種植在海水侵襲得到之地或砂地，也可以生長旺盛，生命力極強。

功用：華北檉柳頗多，檉柳相傳是觀世音菩薩，用來灑水的柳枝，也有藥用用途枝葉有疏風、解表、發汗、利尿、止咳、解毒之效，治疹不透、咳喘、吐血、糖尿病、高血壓；花可清熱毒，治中風；全株及乳汁可藥用。





## 南洋杉 ↓

- 1.南洋杉科，常綠大喬木。
- 2.主幹通直，側枝輪生水平展開，葉子在小枝上呈螺旋狀著生。外形整齊標緻，為世界五大景樹之一。
- 3.葉子鱗形，葉頂端尖被有白粉。
- 4.少開花，木質毬果，成熟時果鱗脫落。



## 龍柏 ↓

- 1.柏科，常綠小喬木。
- 2.是檜柏變種，喜歡溫潤地方，生長緩慢，日本庭園栽培最多
- 3.樹冠是圓柱狀，互相擁抱，各分枝上形成很多尖塔形。
- 4.葉子為針狀，老枝的葉子呈鱗狀，形成針葉與鱗葉混生。
- 5.雌雄同株毬果內有 2-3 粒種子。

